Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

Volume 14
Numéro 34

Mai 2026

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Mai 2026

Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

ZooBank : https://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:
Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue
Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)
à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

https://faunitaxys.fr/

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / ***Faunitaxys*** is indexed in:
- Zoological Record
Articles and nomenclatural novelties are referenced by:
- ZooBank (https://zoobank.org)
Online Archives:
- HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr)
- Internet Archive (https://archive.org/details/faunitaxys)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 07 05 2026

https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(34)

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Pseudagyrta - Pseudohyaleucerea - Kohllius - Polygonoptera - Orbiptera & Morvania* (4e article). 21e note

JEAN-AIMÉ CERDA

BP 98, 97357 Matoury Cedex, Guyane française - patawa2@gmail.com
- ZooBank : https://zoobank.org/CA09A38F-CFCC-47BB-BE4F-C632F6AD83C6

Mots-clés :

Erebidae ;
Arctiinae ;
Ctenuchina ;
Kohllius ;
Polygonoptera ;
Orbiptera ;
Morvania ;
taxonomie ;
Guyane française.

Résumé. – Dix espèces de Guyane sont traitées. Deux combinaisons sont nouvelles : *Morvania beneluzi* (Pinheiro & Cerda, 2016) **comb**. **nov**., et *Kohllius pusillus flaviventris* (Draudt, 1916) **comb**. **nov**. Une synonymie est nouvelle : *Orbiptera germana* **(**Rothschild, 1912) **syn**. **nov**. Une espèce est nouvelle pour la Guyane : *Pseudohyaleucerea vulnerata* (Butler, 1875).

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Pseudagyrta - Pseudohyaleucerea - Kohllius - Polygonoptera - Orbiptera & Morvania* (4e article). 21e note. *Faunitaxys*, 14(34) : 1 – 17.

DOI : https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(34)

ZooBank : https://zoobank.org/8F27B5A2-9E2A-4F5B-9B78-CE7893F1AA19

Received: 09/04/2026 – *Revised*: 23/04/2026 – *Accepted*: 24/04/2026

Le matériel examiné provient des collections suivantes

JAC - Jean-Aimé Cerda,
PC - Philippe Collet,
SF - Serge Fernandez,
BF - Bernard François,
BH - Bernard Hermier,
ML - Michel Laguerre,
OL - Olivier Laurent,
TR - Thibault Rosant,
TT - Tony Tassel.

Anagrammes des institutions

USNM - The United States National Museum (Washington),
NHM - The Natural History Museum (Londres).

Pseudagyrta Cerda, 2020

Espèce type : ***Agyrta semihyalina*** Rothschild, 1912.

• ***Pseudagyrta semihyalina*** (Rothschild, 1912)

(Pl. 2, Fig. 7 ; Pl. 5, Fig. 20)

Agyrta semihyalina Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 164.
- [Brazil] : Fonte Boa (Upper Amazons).

Heliura semihyalina; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 312.
- Brazil : Amazons (Fonte Boa).

Agyrta semihyalina; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 162.
- Amazonas.

Heliura semihyalina; Draudt, 1917, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 212, pl. 30, fig. c[8].

Heliura semihyalina; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 181, pl. 30, fig. c[8].
- Amazone.

Heliura semihyalina; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 12.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Heliura semihyalina; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol.21b: 44, fig. 315.
- Ecuador : Oriente-Orellana (Yasuni 350 m).

Heliura semihyalina; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 11.
- Brazil : Amazonas (Fonte Boa).

Pseudagyrta semihyalina; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 48, pl. 7, fig. 52 & 56.
- Guyane ; Bolivie.

Notes. – Photo de l'holotype d'*Agyrta semihyalina* (NHM) examinée.

A photograph of the holotype of *Agyrta semihyalina* (NHM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 27 spécimens (coll. JAC, TR, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : N2 (pk. 14, 125 & 128), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 38) ;
Zone Coralie-Cacao : Auberge des Orpailleurs, Camp Changement, pistes forestières (Changement) ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 79), pistes forestières, forêt de Tibourou ;
Zone Centrale : Saül (Mont Galbao).

- De juin à avril.

Bolivie, La Paz :
Rte. Camata-Apollo (1400 m). Décembre.
Rte. Caranavi-Carasco pk. 26. Décembre.

Pseudohyaleucerea Rego Barros & Machado, 1980

Espèce type : ***Hyaleucerea vulnerata*** Butler, 1875.

• ***Pseudohyaleucerea vulnerata*** (Butler, 1875)

(Pl. 2, Fig. 6 ; Pl. 6, Fig. 25)

Hyaleucerea vulnerata Butler, 1875, An. Mag. of Nat. Hist. (4) 15: 399.
- [Brazil] : Espiritu Santo.

Hyaleucerea vulnerata; Butler, 1876, Jour. of the Linnean Soc. XII (60-62): 430.

Hyaleucerea vulnerata; Druce, [1897], Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. II: 365.

Reviewer : Michel Laguerre (*Université de Bordeaux, France*) - https://orcid.org/0000-0002-6524-7069 - https://zoobank.org/2146C3FF-355D-4649-AB4B-20BE73BDC602

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
Copyright 2026. The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

- Mexico : Jalapa ; Panama : Chiriqui ; Brazil : Espirito Santo.

Hyaleucerea vulnerata; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 203.
- [Brazil] : Espirito Santo.

Hyaleucerea vulnerata; Druce, [1897], Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. III: pl. 73, fig. 16.

Hyaleucerea vulnerata; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 534, fig. 282.
- Mexico : Jalapa ; Brazil : Espirito Santo.

Hyaleucerea vulnerata; Druce, [1900], Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. I: xiv.

Hyaleucerea vulnerata; Druce, [1900], Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. II: 596.

Hyaleucerea vulnerata; Schrottky, 1902, D. Entomol. Zeit."Iris" XV: 136.
- Argentinien: Buenos Aires.

Hyaleucerea vulnerata; Schrottky, 1909, D. Entomol. Zeit."Iris": 125.
- Von Buenos Aires bis Mexico.

Hyaleucerea vulnerata; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 153.
- Mexico ; Panama; [Brazil] : São paulo; Espírito Santo ; Paraguay ; Argentinien.

Hyaleucerea vulnerata; Jorgensen, 1913, Zeits. für wissens. Insekten. IX (18 [2]): 76.
- Von Buenos Aires bis Mexico.

Hyaleucerea vulnerata; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 379.

Hyaleucerea vulnerata; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 194, pl. 26, fig. i[3].
- Von Mexiko bis Argentinien.

Hyalina vulnerata; Zikán, 1928, Entomol. Rundsch. 45(10): 39.
- [Brazil] : [Rio de Janeiro] (Itatiaya-Campo-Bello).

Hyaleucerea vulnerata; Zerny, 1931, Dtsch. Entomol. Z., Dresden, Bd. 45: 26.
-[Brazil] : Santa Catharina (Jaraguá).

Hyaleucerea vulnerata; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 263.
- Mexico; Panama; [Brazil] :Pará (Taperinha), Espirito Santo, [Rio de Janeiro] (Itatiaya), São Paulo, Sta. Catharina; Paraguay ; Argentinien ; Bolivien (subsp. *boliviana*).

Hyaleucerea vulnerata; Hoffmann, 1933, Anales del Instituto de Biologia IV(3- 4): 251.
- [Mexico] : Veracruz (La Granja).

Hyaleucerea vulnerata; Hoffmann, 1936, Entomol. Rundsch. 53(31): 451.
- [Brazil] : Sta Catharina (Jaraguá).

Hyaleucerea vulnerata; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará, Sul do Paiz.

Hyaleucerea vulnerata; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 204, pl. 26, fig. i[3].
- Du Mexique à l'Argentine.

Hyaleucerea vulnerata; Travassos, 1940, Arq. Zool. Est. S. Paulo II(10): 295.
- [Brazil] : São Paulo (Capital, Ilha Sêca, Alto da Serra do Santos, Piassaguera, Araras), Mato-Grosso (Salobra), Paraná (Ponta Grossa) ; México ; Panamá ; Paraguai ; Argentina.

Hyaleucerea vulnerata; Travassos, 1945, Papéis Avulsos VI(4): 35.
- [Brazil] : São Paulo (Capital, serra de Santos, Piassaguerra, Araras, Ilha Sêca, Monte Alegre[Fazenda Santa Maria, 1100 mts & Fazenda Bom Jesus, 800 mts), Mato-Grosso (Salobra), Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Districto Federal ; México ; Panamá ; Paraguai ; Argentina.

Pseudohyaleucerea vulnerata; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 174.
- [Brazil] : Rio de Janeiro (Pétropolis, Tinguá, Grajaú, Itatiaia, Rio [Gavea], Nova Friburgo), Amazônas (São Paulo de Olivença, Parko), Pará (Santarém), São Paulo (Amaparo, Rio Claro), Amapá (Serra do Navio), Sta. Catarina (Joinville) ; Venezuela : Esteban Valley (Las Quignas).

Hyaleucerea vulnerata; Pérez-Ruiz & Sanchez-Sarabia, 1979, An. Inst. Univ. Nat. Autón 50: 518bis, 527 & 530.
- México : Veracruz (Los Tuxtlas), Puebla, Chiapas (Selva Lacandona) ; Argentina ; Paraguay; Brasil ; Panamá.

Hyaleucerea vulnerata; Biezanko, 1983, Rev. Centro de Ciências Rurais 13(4): 235.
- [Brazil] : Suest do Rio Grande do Sul.

Hyaleucerea vulnerata; Biezanko, 1985, Rev. Centro de Ciências Rurais 15(3): 193.
- [Brazil] : Rio Grande do Sul (Missioneira).

Hyaleucerea vulnerata; Beutelspacher Baigts, 1988 (1987)An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón 58(1): 468.
- [Mexique] : Ver[acruz] (Misantla).

Hyaleucerea vulnerata; Pérez-Ruiz & Sanchez-Sarabia, 1989, An. Inst. Univ. Nat. Autón 60(3): 393-394.
- [Mexique] : Veracruz (Los Tuxtlas-Hidalgo & Oaxaca).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Watson, Fletcher & Nye, 1995, Noctuoidea: Arctiidae to Thyretidae *in* Nye: 162.

Pseudohyaleucerea vulnerata; Marinoni & Dutra., 1996, Rev. Bras. Zool. 13(2): 439.
- [Brazil] : Paraná (São José dos Pinhais, Guarapuava, Fênix).

Hyaleucerea vulnerata; Grados, 1997, Biod. Assec. & Monit., SI/MAB Ser. 1: 130.
- Perú : Cuzco (Lower Urubamba region-San Martin).

Hyaleucerea vulnerata; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 13.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Pseudohyaleucerea vulnerata; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 66.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (Segakiato 280 m, Las Malvinas 380-480 m, San Martin 475 m, Cashiriari 590 m).

Hyaleucerea vulnerata; Teston & Corseuil, 2003, Biocienscias 11(1): 85.
- Brazil : Rio Grande do Sul.

Pseudohyaleucerea vulnerata; Teston & Corseuil, 2003, Biocienscias 11(1): 85.
- Brazil : Rio Grande do Sul.

Hyaleucerea vulnerata; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol.21b: 33-34, fig. 188-190.
- Ecuador : Costa-Pichincha (Alluriquin 1025m, Toachi 970 m), Esmeraldas (Quinindé 550 m).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Teston & Corseuil, 2004, Rev. Bras. Ent. 48(1): 80.
- Brasil : Rio Grande do Sul (Camaquã, Iraí, Lagoa Vermelha, São Pedro da Serra).

Hyaleucerea vulnerata; Hernández-Baz & Grados, 2004, *Folia Entomol. Me.* 43(2): 211.
- México : Veracruz.

Pseudohyaleucerea vulnerata; Teston & al., 2006, Rev. Bras. Ent. 50(2): 282.
- Brasil : Rio Grande do Sul (Parque Estadual do Espigão Alto, Parque Estadual de Rondinha, Parque Estadual do Turvo e RBI, Reserva Biológica do Ibirapuitã).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Ferro & Diniz, 2007, Rev. Bras. de Zoologia 24(3): 643.
- [Brazil] : São Paulo (Águas de Santa Bárbara, Assis).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Ferro, Resende & Duarte, 2007, Biota Neotropica 7(3): 333.
- Brasil : São Paulo (Salesópolis-Boracéia).

Hyaleucerea vulnerata; Hernández-Baz, 2007, *Dugesiana* 14(2): 103.
- [Mexique] : Alta Verapáz (Santa Lucía), Izabal (Livingstón, Santo Tomás de Castilla).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Ferro & Teston, 2009, Rev. Bras. Ent. 53(2): 284.
- Brasil : Rio Grande do Sul (Camaquã, Derrubadas, Guarani das Missões, Iraí, Lagoa Vermelha, Morro Reuter, Pelotas, São Pedro da Serra).

Hyaleucerea vulnerata; Hernández-Baz, 2011, Biodiversidad en Veracruz II Apéndice VIII(26): 9
- [Mexique] : Veracruz.

Hyaleucerea vulnerata; Miller & al., 2012, Insecta Mundi 0205: 33.
- Honduras : La Ceiba (Pico Bonito).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Ferro, Resende & Duarte, 2012, Biota Neotropica 12(4): 175.
- Brasil : Santa Catarina (Joinville, São Bento do Sul, Seara).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Turrent-Diaz & Pescador Rubio, 2013, Rev. Soc. Mex. Lep. I(1): 8.
-[Mexique] : Chiapas (Chajul-Marqués de Comillas).



Planche 1. Habitus (recto-verso).

1. *Kohllius pusillus pusillus* ♂. **2**. *Kohllius pusillus pusillus* ♀. **3**. *Polygonoptera excavata* ♂. **4**. *Polygonoptera flava* ♂. **5**. *Polygonoptera roseiventris* ♂.

Pseudohyaleucerea vulnerata vulnerata; Hernández-Baz & al., 2013, Jour. of the Lep. Soc. 67(3): 149 & 153.
- México : Chiapas : (San Cristóbal de las Casas, Maravilla Tenejapa-Ejido loma Bonita, Ocosingo-Lacanjá Chansayab).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Sylva & Sylva, 2014, EntomoBrasilis 7(3): 225.
- Brazil : Santa Catarina (Seara).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Hyaleucerea vulnerata; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 12.
- Brazil : Amazon (Valley of Amazonas [river], São Gabriel [da Cachoeira]-Taracúa) ; Pará (Belterra-National Forest of Tapajós, Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu-Serra do Pardo National Park).

Pseudohyaleucerea vulnerata; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 50.
- Paraguay ; Equateur ; Nicaragua.

Glaucopis myrrhine Burmester, 1878, Descrip. Phys. de la Rep. Argentine V (I): 375.
- Buénos-Ayres.

Glaucopis myrrhine; Burmester, 1879, Descrip. Phys. de la Rep. Argentine II Atlas: 30.

Glaucopis myrrhine; Burmester, 1880, Descrip. Phys. de la Rep. Argentine II Atlas: pl.XVII, fig. 6.

Cosmosoma myrrhine; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 142.
- [Argentine] : Buenos Aires.

Glaucopis myrrhine; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 537.

Hyaleucerea vulnerata boliviana Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6:194. **Syn**. **nov**.
- Bolivien : Rio Songo.

Hyaleucerea vulnerata boliviana; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 204.
- [Bolivie] : Rio Songo.

Hyaleucerea vulnerata boliviana; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nac. 54: 171.

Historique. – Schrottky [1902], considère *Glaucopis myrrhine* Burmeister, 1878 comme un synonyme plus récent de *Hyaleucerea vulnerata* Butler, 1875.
Draudt [1916] invente une nouvelle sous espèce "*boliviana*".
Zikán [1928], invente le genre *Hyalina* pour *vulnerata* et deux autres espèces indéterminées.
Rego Barros & Machado [1971], ignorant Zikán, inventent le genre *Pseudohyaleucerea* pour *vulnerata* et la nouvelle espèce *manicorensis*.
Rego Barros & Machado [1980], désignent *vulnerata* comme espèce type du genre *Pseudohyaleucerea*.

Schrottky [1902] considers *Glaucopis myrrhine* Burmeister, 1878, to be a junior synonym of *Hyaleucerea vulnerata* Butler, 1875.
Draudt [1916] invents a new subspecies, "*boliviana*".
Zikán [1928] invents the genus *Hyalina* for *vulnerata* and two other undetermined species.
Rego Barros & Machado [1971], unaware of Zikán's work, invented the genus *Pseudohyaleucerea* for *vulnerata* and the new species *manicorensis*.
Rego Barros & Machado [1980] designated *vulnerata* as the type species of the genus *Pseudohyaleucerea*.

Notes. – Le genre *Hyalina* Zikán, 1928, est un homonyme plus récent de *Hyalina* Schumacher, 1817 (Gastropoda). Il a la même espèce type que *Pseudohyaleucerea* et est donc aussi un synonyme objectif de *Pseudohyaleucerea*. Nous ne pouvons pas remplacer *Hyalina* Zikán, car le nom de remplacement deviendrait un synonyme plus récent et serait invalide automatiquement.
En l'absence de désignation de l'espèce type, le genre *Pseudohyaleucerea* Rego Barros & Machado [1971], est invalide. Il devient valide en 1980, après la désignation de l'espèce type *vulnerata*.
Teston & Corseuil [2003] citent *vulnerata* à la fois dans le genre *Hyaleucerea* et dans le genre *Pseudohyaleucerea*.
Dans Bold tous les spécimens séquencés, du Guatemala au Paraguay sont sous le même BIN et sont donc conspécifiques. Nous avons donc considéré *Hyaleucerea vulnerata boliviana* Draudt, 1916 **syn**. **nov**., comme un synonyme plus récent de *Hyaleucerea vulnerata* Butler, 1875.
Photo de l'holotype de *Hyaleucerea vulnerata* (NHM) examinée.

The genus *Hyalina* Zikán, 1928, is a more recent homonym of *Hyalina* Schumacher, 1817. It shares the same type species as *Pseudohyaleucerea* and is therefore also an objective synonym of *Pseudohyaleucerea*. We cannot replace *Hyalina* -Zikán, as the replacement name would become a more recent synonym and would automatically be invalid.
In the absence of designation of a type species, the genus *Pseudohyaleucerea* Rego Barros & Machado [1971] is invalid. It became valid in 1980, after the designation of the type species *vulnerata*.
Teston & Corseuil [2003] cite *vulnerata* in both the genus *Hyaleucerea* and the genus *Pseudohyaleucerea.*
In Bold, all sequenced specimens from Guatemala to Paraguay are under the same BIN and are therefore conspecific. We have thus considered *Hyaleucerea vulnerata boliviana* Draudt, 1916 **syn**. **nov**., as a more recent synonym of *Hyaleucerea vulnerata* Butler, 1875.
Photograph of the holotype of *Hyaleucerea vulnerata* (NHM) examined.

Nouveau pour la Guyane.

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 46 spécimens (coll. JAC, SF, ML).

Guyane française
Zone Montsinéry : Galion ;
Zone Tumuc Humac : Borne 1.
- Septembre-octobre.

Guatemala
- Izabal : Finca Firmeza. Mai.
- Baja Verapaz : Refugio del Quetzal. Mai.

Bélize
Stann Creek :
- Trees-37 km W. of Dangrigua, 186 m. Août.
- Bocawina-16 km W. of Dangrigua, 83 m. Août.

Nicaragua
- Matagalpa : Tuma la Dalla-Ecolodge La Sombra. Juin.
- Jinotega : San Rafael del Norte-Reserva El Jaguar. Mai.

Equateur
Pichincha : Tinalandia-Sto Domingo do los Colorados, 650 m. Avril.
Esmeraldas :
- Rte Lita-San Lorenzo pk. 12, 850 m. Août.
- Lita. Août.
- Pichincha : Rte Alluriquin-Chiriboga. Août.

Pérou
Cuzco : Rte Manu-Pillicopata-Villa Carmen, 535 m. Octobre.

Bolivie
La Paz :
- Rte. Camata-Apollo (1000 m).Décembre.
- Inca Huara, 1450 m. Novembre.
- Rte Coroico-Chuspipata. Octobre.
- Rte Chulumani-Inquisivi. Octobre.
- Chuquisaca : Rte Padilla-Camiri. Novembre.
- Cochabamba : Vieille Rte Santa Cruz-Cochabamba (Mataral). Février.

Brésil
- Rondonia : Cacaulandia. Novembre.
- São Paulo : Apiai. Janvier.
- Parana : Ponta Grossa. Février.

Paraguay
Alto Parana :
- Puerto Bertoni. Septembre-octobre.
- Estancia Dimas. Juillet-août.
- Itabo. Octobre.
- Limoy. Janvier.



Planche 2. Habitus (recto-verso).

6. *Pseudohyaleucerea vulnerata* ♂. **7**. *Pseudagyrta semihyalina* ♂. **8**. *Polygonoptera excavata* ♀. **9**. *Polygonoptera flava* ♀. **10**. *Polygonoptera roseiventris* ♀.

Cordillera :
- Tacuara Renda. Août.
- Pirareta. Juillet.
Caazapa :
- Tavaï. Septembre.
- Colonia Neufeld. Novembre.

Argentine : Misiones : Dos de Mayo. Décembre.

Kohllius Cerda, 2020

Espèce type : ***Acridopsis pusilla*** Butler, 1878.

• ***Kohllius pusillus pusillus*** (Dognin, 1910)

(Pl. 1, Fig. 1 & 2 ; Pl. 6, Fig. 24)

Acridopsis pusilla Butler, 1878, Trans. Entomol. Soc. I: 44.
- [Brazil] : Rio Javary (Braga).

Acridopsis pusilla; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 165.
- [Brazil] : Amazons.

Neacerea pusilla; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 480, pl. 16, fig. 23.
- [Brazil] : Amazons (R. Javary).

Delphyre pusilla; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 136.
- [Brazil] : Amazonas ; Westindien ?. [In part].

Delphyre pusilla; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 165, pl.24, fig. c[2].
- Von Guyana bis Amazonas.

Delphyre pusilla; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 256.
- [Brazil] : Pará (Taperinha), Amazonas (Braga am Rio Javary) ; Holl.- und Franz.-Guyana.

Delphyre pusilla; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela (Rio Caura) ; Ilha Trinidad. [In part].

Delphyre pusilla; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 175, pl.24, fig. c[2].
- De la Guyane à l'Amazone.

Delphyre pusilla; Kiriakoff, 1948, Bull. Ann. Soc. R. Entomol. Belg. 84: 260.

Delphyre pusilla; Betz, 1972, Bull. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 405.
- Guyane française : [Saint-Laurent du Maroni] (Nouveau Chantier), Maroni ; Brésil.

Delphyre pusilla; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 91.
- Guyane française : [Ht. Itani] ([saut] Lavaud), Moloko Imene.

Delphyre pusilla; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 12.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Delphyre pusilla; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol. 21b: 24, fig. 77-78.
- Ecuador : Oriente-Napo (El Reventador 1500 m).

Delphyre pusilla; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 7.
- Brazil : Amazonas (Atalaia do Norte : Rio Javary & Braga, São Paulo de Olivença), Amapa (Serra do Navio), Pará (Maraba, Santarem-Taperinha), Rondonia (Cacaulândia, Porto Velho).

Kohllius pusillus; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9: 106, fig.52, pl. 19, fig. 148 & 152.
- Guyane.

Historique. – Hampson [1898], tout en gardant *pusilla* en tant que *bona species*, émet l'hypothèse que *Sphinx dares* Cramer, 1775 puisse être un synonyme.
Zerny [1912], suit Hampson en considérant aussi *dares* en tant que potentiel synonyme, il ajoute pour *dares* "*nomen prius, sed incertum*".
Draudt [1916], fait de même en mettant sans certitude *dares* en tant que potentiel synonyme. Il décrit aussi *Delphyre pusilla flaviventris*.

Hampson [1898], while retaining *pusilla* as a *bona species*, hypothesizes that *Sphinx dares* Cramer, 1775, might be a synonym.
Zerny [1912] follows Hampson in also considering *dares* as a potential synonym, adding for *dares* "*nomen prius, sed incertum*" (name first, but uncertain).
Draudt [1916] does the same, tentatively listing *dares* as a potential synonym. He also describes *Delphyre pusilla flaviventris*.

Notes. – Un problème se pose avec *Kohllius pusillus*. Plusieurs spécimens de Guyane ont été séquencés sous le BIN [BOLD:AAM8695], mais un spécimen apparaît sous un autre BIN [BOLD:ADF8621]. Nous avons donc deux espèces distinctes séparées de 3,08%, ayant le même habitus. Malheureusement aucun des spécimens séquencés n'a été disséqué, nous ne pouvons donc pas connaitre auquel des deux correspond nos spécimens. L'holotype n'ayant été ni disséqué ni séquencé, il ne nous est pas non plus possible de savoir laquelle des deux espèces est conspécifique de *pusillus*. Toutes les localités de *K. pusillus* sont donc douteuses et devront être confirmées.
Nous avons disséqué un spécimen identique à *Kohllius pusillus flaviventris* **comb**. **nov**., ses genitalia sont identiques à ceux de notre spécimen disséqué de la forme originale. L'holotype de *flaviventris* n'ayant pas lui non plus été disséqué ni séquencé, il n'est donc pas du tout certain qu'il soit conspécifique de notre spécimen. Partant de ce constat, nous maintenons *Kohllius pusillus flaviventris* **comb**. **nov**., en tant que sous-espèce.
Photos des holotypes d'*Acridopsis pusilla* (NHM), et de *Delphyre pusilla flaviventris* (NHM), examinées.

A problem arises with *Kohllius pusillus*. Several specimens from French Guiana have been sequenced under the BIN [BOLD:AAM8695], but one specimen appears under a different BIN [BOLD:ADF8621]. We therefore have two distinct species separated by 3.08% with the same habitus. Unfortunately, none of the sequenced specimens have been dissected, so we cannot determine which of the two corresponds to our specimens. Since the holotype has neither been dissected nor sequenced, we also cannot determine which of the two species is conspecific with *pusillus*. All localities of *K. pusillus* are therefore doubtful and will need to be confirmed.
We dissected a specimen identical to *Kohllius pusillus flaviventris* **comb**. **nov**.; its genitalia are identical to those of our dissected specimen of the original form. Since the holotype of *flaviventris* has also not been dissected nor sequenced, it is by no means certain that it is conspecific with our specimen. Based on this observation, we maintain *Kohllius pusillus flaviventris* **comb**. **nov**., as a subspecies.
Photographs of the holotypes of *Acridopsis pusilla* (NHM), and of *Delphyre pusilla flaviventris* (NHM), have been examined.

Espèce capturée au piège lumineux et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 160 spécimens (coll. JAC, TR, BH, BF, PC, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : St. Georges, N2 (pk. 7, 14 & 128), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Ouanari : Ouanari ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, Camp Caïman, route de Kaw (pk. 3.5, 10, 27.5, 37, 38, 41-43 & 45), Camp Asarco ;
Zone Montsinéry : piste de Saut Léodate (pk. 4,5), Nancibo (pk. 3) ;
Zone Coralie-Cacao : Cacao, Auberge des Orpailleurs, Camp Changement, Crique Bagot (dégrad Kwata), Carbets de Coralie (parking d'altitude) ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 70 & 79), pistes forestières ;
Zone Nouragues-Arataï : Nouragues (inselberg), Mont Chauve ;
Zone Kourou : Mtgne des Singes ;
Zone Sinnamary : Malmanoury, route de Petit Saut (pk. 22) ; **Zone Iracoubo** : piste Patagaï, savane Flèche & Trou Poissons, piste Dégrad Florian (pk. 6 & 12,6) ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier ;
Zone Bas-Maroni : D11 (pk. 7,5), Plateau des Mines, Awara, village Espérance, village Société, piste Paul Isnard (pk.20 & 57), piste Crique Serpent (pk. 17 & 31,5), Moutouchi, route d'Apatou (pk. 25,5) ;
Zone Grand Santi : Grand Santi ;
Zone Centrale : Saül (environs & Mont Galbao-carbet ONF) ;
Zone Haut-Maroni : Antecume Pata, Grand Inini (3°29.N 53°42.W, saut Batardeau) ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka sud.

- Toute l'année.

Brésil : Rondonia : Vilhena. Décembre.



Planche 3. Habitus (recto-verso).

11. *Orbiptera bleuzeni* ♂. **12**. *Orbiptera bleuzeni* ♀. **13**. *Orbiptera macella* ♂. **14**. *Orbiptera macella* f. *germana* ♂. **15**. *Orbiptera macella* f. *germana* ♀.

Polygonoptera Cerda, 2020

Espèce type : ***Eucereon excavata*** Dognin, 1910.

• ***Polygonoptera excavata*** (Dognin, 1910)

(Pl. 1, Fig. 3 ; Pl. 2, Fig. 8 ; Pl. 5, Fig. 21)

Eucereon excavata Dognin, 1910, Rennes I: 5.
- Guyane française : [Saint-Laurent du Maroni] (Nouveau Chantier).

Eucereum [*sic*] *excavatum*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 139. [Emendation éronnée].
- Franz.-Guayana.

Eucereon excavata [*sic*]; Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 171-172.

Heliura excavata; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 313, fig. 47.
- Fr. Guiana.

Eucereum [*sic*] *excavatum*; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 171.

Heliura excavata; Draudt, 1917, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 212.

Heliura excavata; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 179.

Eucereon excavatum; Betz, 1972, Bull. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 406.
- Guyane française : [Saint-Laurent du Maroni] (Nouveau Chantier).

Heliura excavata; Pinheiro & Gall-Haszler, 2015, Zootaxa 3925(4): 512.

Heliura excavata; Pinheiro & Duarte, 2016, An. Soc. Entomol. de Fr. (N.S.): 2-3 & 14.

Heliura excavata; Pinheiro & Duarte, 2017, Zootaxa 4312 (2): 247 & 255.

Heliura excavata; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 11.
- Brazil : Amazonas (Benjamin Constant), Pará (Belterra-National Forest of Tapajós, Igarapé Açú, Santarém).

Polygonoptera excavata; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 56.
- Guyane.

Heliura excavata; Grados, 2023, Rev. Chiliena de Entomol. 49(4): 675.

Notes. – La citation d'*Heilura* [*sic*] *excavata*; Powel & al., 2008, est erronée, il s'agit en fait d'un spécimen de Phaegopterina du genre *Hypercompe*. Cette espèce est donc à supprimer de la Dominique.
Photo de l'holotype d'*Eucereon excavata* (USNM) examinée.

The citation of *Heilura* [*sic*] *excavata*; Powell et al., 2008, is incorrect; it is actually a specimen of Phaegopterina of the genus *Hypercompe*. This species should therefore be removed from Dominica.
Photograph of the holotype of *Eucereon exvata* (USNM) examined.

Espèce capturée au piège lumineux, et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 67 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou), St. Georges, N2 (pk. 7, 14 & 128) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 22, 32, 37-38 & 42) ;
Zone Montsinéry : Galion, piste de Saut Léodate ;
Zone Coralie-Cacao : Cacao (la Source), Crique Bagot (dégrad Kwata), Carbets de Coralie, Camp Changement, Auberge des Orpailleurs ;
Zone Bélizon : piste Tibourou, pistes forestières (pk. 27), N2 (pk. 78) ;
Île de Cayenne : Matoury (savane Cavalet) ;
Zone Sinnamary : piste de St. Elie (pk. 15), Combi (Cirad), Pointe Combi ;
Zone Iracoubo : piste de Patagaï, savane Trou Poissons ;
Zone Mtgne Trinité : Mont Tabulaire ;
Zone Bas-Maroni : Moutouchi, piste Paul Isnard (pk. 56 & 57), D11 (pk. 7,5), Plateau des Mines, village Société, Awara, piste Crique Serpent ;
Zone Grand Santi : Grand Santi.

- Toute l'année.

Brésil : Rondonia : Vilhena. Décembre.

• ***Polygonoptera flava*** (Dognin, 1910)

(Pl. 1, Fig. 4 ; Pl. 2, Fig. 9 ; Pl. 5, Fig. 22)

Eucereon excavata var. *flava* Dognin, 1910, *Rennes* I: 6.
- Guyane française : Saint-Laurent du Maroni.

Eucereum [*sic*] *excavatum* ab. *flavum*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 139. [Emendation éronnée].
- Franz.-Guayana.

Heliura excavata ab. *flava*; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 314.
- Fr. Guiana.

Eucereum [*sic*] *flavum*; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 171, pl. 24, fig. h[1].
- Französisch-Guyana : St. Laurent du Maroni (Nouveau Chantier).

Heliura flava; Draudt, 1917, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 212.

Heliura flava; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 179, pl. 24, fig. h[1].
- Guyane française : Saint Laurent du Maroni (Nouveau Chantier).

Heliura flava; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 91.
- Guyane française : [Ht. Itani] (Lavaud).

Polygonoptera flava; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 56.
- Guyane.

Historique. – Draudt [1916], considére *Eucereon excavata* var. *flava* en tant que *bona species*.
Draudt [1916], considers *Eucereon excavata* var. *flava* as a *bona species*.

Notes. – Photo de l'holotype d'*Eucereon excavata* var. *flava* (USNM) examinée.
Photograph of the holotype of *Eucereon exvata* var. *flava* (USNM) examined.

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 95 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : inselberg (4°00.80N-52°15.56W), N2 (pk. 128) ;
Zone Mtgne de Kaw : Camp Caïman, Patawa, route de Kaw (pk. 3.5, 10, 15, 28, 32, 37, 43, 45 & 47) ;
Zone Montsinéry : Galion, piste de Saut Léodate (pk. 4,5 & 6), Nancibo (pk. 2 & 9) ;
Zone Coralie-Cacao : Carbets de Coralie (parking d'altitude), Camp Changement, pistes forestières ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 76,7), pistes forestières (pk. 4 & 27) ;
Zone Sinnamary : Combi (Cirad), Pointe Combi, route de Petit Saut (pk. 22) ;
Zone Iracoubo : piste Patagaï (pk.10), savane Trou Poissons, piste Mtgne de Fer, piste Dégrad Florian (pk. 3 & 12,6) ;
Zone Bas-Maroni : Angoulème, piste Crique Nai, piste Paul Isnard (scierie), route d'Apatou (pk. 28), D11 (pk. 7,5), St. Jean, Plateau des Mines, piste Crique Serpent ;
Zone Centrale : Saül (bourg, environs & Mont Galbao) ;
Zone Haut-Maroni : Antecume Pata.

- De juin à avril.

Guyana : Mazarumi : Maruma Mont 600 m. Avril.

• ***Polygonoptera roseiventris*** Cerda, 2020

(Pl. 1, Fig. 5 ; Pl.2, Fig. 10 ; Pl. 5, Fig. 23)

Heliura perexcavata; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 91. [Identification erronée].
- Guyane française : Ht. Itani ([saut] Lavaud).

Delphyra [*sic*] *maculosa*; Betz, 1981, Bull. Soc. Entomol. Fr. (86): 30. [Identification erronée].
- Guyane française : Saül.

16

17

18

a

b



c

d

19

a

b

c

d

Planche 4. Habitus (recto-verso) & Genitalia.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Aedeagus.

16. *Morvania dilatata* ♂. **17**. *Morvania beneluzi* ♂. **18-19**. Genitalia ♂. **18**. *Morvania dilatata* Guyane. **19**. *Morvania beneluzi* Guyane.

Polygonoptera roseiventris Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 56, fig. 29, 59, pl. 10, fig. 74 & 78.
- Guyane.

Notes. – *Heliura perexcavata*; Betz, 1980, et *Delphyre maculosa*; Betz, 1981, sont des identifications erronées. Ces deux taxa doivent être supprimés de la faune de Guyane.

Heliura perexcavata; Betz, 1980, and *Delphyre maculosa;* Betz, 1981, are erroneous identifications. These two taxa should be removed from the fauna of French Guiana.

Espèce capturée au piège lumineux. Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 57 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BF, BH, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou), N2 (pk. 125 &128) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 15, 29, 37 & 38) ;
Zone Coralie-Cacao : route de Cacao (pk. 1), Carbets de Coralie, Camp Changement, pistes forestières, N2 (pk. 41 & 43), Auberge des Orpailleurs ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 79 & 104), piste Tibourou, pistes forestières ;
Zone Nouragues-Arataï : Nouragues (inselberg) ;
Zone Mtgne Trinité : Mont Tabulaire ;
Zone Bas-Maroni : Plateau des Mines, village Espérance, piste Crique Serpent ;
Zone Centrale : Hte. Mana (St. Léon) ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka.

- De novembre à septembre.

Orbiptera Cerda, 2020

Espèce type : ***Neacerea macella*** Dognin, 1911.

• ***Orbiptera macella*** (Dognin, 1911)
(Pl. 3, Fig. 13-15 ; Pl. 6, Fig. 26)

Neacerea macella Dognin, 1911, *Rennes* II: 11.
- Guyane française : [Saint-Laurent du Maroni] (Nouveau Chantier).

Delphyre macella; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 136.
- Franz.-Guayana.

Delphyre macella; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 292, fig.44.
- Fr. Guiana : [Saint-Laurent du Maroni] (Nouveau Chantier).

Delphyre macella; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 166, pl. 24, fig. e[4].
- Französisch-Guyana.

Delphyre macella; Forbes, 1939, Bull. Mus. Comp. Zoöl. 85(4): 150.

Delphyre macella; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 176, pl. 24, fig. e[4].
- Guyane française.

Delphyre macella; Betz, 1972, Bull. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 406.
- Guyane française : Saint-Laurent du Maroni.

Neacerea macella; Grados, 1997, Biod. Asse. & Monit. Ser. 1: 130.
- Perú : Lower Urubamba (San Martin).

Delphyre macella; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 65.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (Las Malvinas 380-480 m, San Martin 475m).

Delphyre macella; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol.21b: 26, fig. 97.
- Ecuador : Oriente-Orellana (Yasuni 350 m).

Delphyre macella; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 6.
- Brazil : Pará (Marabá).

Orbiptera macella; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9: 61, fig. 31, pl. 11, fig. 81 & 85.
- Guyane.

Heliura germana Rothschild, 1912, 1912, Novitates Zoologicae 19(2): 167. **Syn**. **nov**.
- Surinam : Maroewym Valley (Aroewarwa Creek).

Delphyre germana; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 293, pl. XVI, fig. 22.
- Surinam : Maroewym Valley (Aroewarwa Creek).

Heliura germana; Draudt, 1916, *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde 6: 170.
- Surinam.

Delphyre germana; Draudt, [1940?], *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6: 177, pl. 29, fig. m[7].
- Surinam.

Delphyre germana; Betz, 1981, Bull. Soc. Entomol. Fr. (86): 68.
- Guyane française : St. Jean du Maroni ; Surinam.

Orbiptera germana; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 61, fig. 31, pl. 11, fig. 83 & 87.
- Guyane.

Notes. – Forbes [1939], émet l'hypothèse que *Delphyre aurorina* Forbes, 1939, puisse être la femelle d'*Orbiptera macella*. *Delphyre aurorina* Forbes, 1939, n'est pas la femelle de *O. macella*.
Dans BOLD quatre spécimens ont été séquencés : deux spécimens sous *germana* (forme noire), et deux, sous *macella* et *Eucereon* (forme rouge). Ces quatre spécimens ayant le même BIN [ADF9926], nous avons donc considéré *Heliura germana* Rothschild, 1912 **syn**. **nov**., comme un synonyme plus récent de *Neacerea macella* Dognin, 1911. *O. germana* étant la forme noire de *O. macella*.
Photos des holotypes de *Neacerea macella* (USNM) et d'*Heliura germana* (NHM) examinées.

Forbes [1939] hypothesized that *Delphyre aurorina* Forbes, 1939, might be the female of *Orbiptera macella*. However, *Delphyre aurorina* Forbes, 1939, is not the female of *O. macella*.
In BOLD, four specimens were sequenced: two under *germana* (black form), and two under *macella* and *Eucereon* (red form). Since these four specimens have the same BIN [ADF9926], we consider *Heliura germana* Rothschild, 1912 **syn**. **nov**., as a more recent synonym of *Neacerea macella* Dognin, 1911. *O. germana* is the black form of *O. macella*.
Photographs of the holotypes of *Neacerea macella* (USNM) and *Heliura germana* (NHM) examined.

Espèce capturée au piège lumineux, et aux pyrrolizidines.
Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 38 spécimens (coll. JAC, TR, BH, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 28 & 43) ;
Zone Coralie-Cacao : Crique Bagot (dégrad Kwata), Carbets de Coralie (carbets & parking d'altitude), N2 (pk. 41) ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 79) ;
Zone Kourou : N1 (pk. 70 [Chawari]) ;
Zone Sinnamary : Pointe Combi, route de Petit Saut (pk.19) ;
Zone Iracoubo : Trou Poissons, piste de la Mtgne de Fer, piste Dégrad Florian (pk. 12,6) ;
Zone Bas-Maroni : Moutouchi, route d'Apatou (pk. 15, 25.5, 28), piste Paul Isnard (pk. 57), piste Crique Serpent ; Zone Grand Santi : Grand Santi ;
Zone Centrale : Hte. Mana (St. Léon) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (Amadou), Antecume Pata.

- De juillet à mai.

• ***Orbiptera bleuzeni*** Cerda, 2020
(Pl. 3, Fig. 11-12 ; Pl. 6, Fig. 27)

Orbiptera bleuzeni Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9: 63, fig. 31, pl. 11, fig. 82 & 86.
- Guyane.

Notes. – Dans BOLD sous le BIN [AAM8692] six spécimens ont été séquencés, cinq femelles (deux sous *Delphyre* et trois sous *Delphyre macella*) et un mâle (sous *Delphyre germana*). Tous ces spécimens sont en fait des *Orbiptera bleuzeni*. Nous avons été surpris de ce résultat, car en premier lieu, nous avions attribué toutes ces femelles aux mâles de *O. macella*, ces femelles possédant le même morphe. Encore une fois, sans la génétique nos conclusions auraient été erronées. Il est à noter que les femelles peuvent avoir un abdomen rouge ou jaune.



Planche 5. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Vue latérale droite. **e**. Aedeagus.

20. *Pseudagyrta semihyalina* Guyane. **21**. *Polygonoptera excavata* Guyane. **22**. *Polygonoptera flava* Guyane. **23**. *Polygonoptera roseiventris* Guyane.

In BOLD under BIN [AAM8692], six specimens were sequenced: five females (two under *Delphyre* and three under *Delphyre macella*) and one male (under *Delphyre germana*). All of these specimens are in fact *Orbiptera bleuzeni*. We were surprised by this result because, initially, we had attributed all these females to males of *O. macella*, as these females possess the same morphology. Again, without genetics, our conclusions would have been incorrect. It should be noted that the females can have a red or yellow abdomen.

Espèce capturée au piège lumineux, ex. pupa, et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap, ex pupa, and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 60 spécimens (coll. JAC, TR, BH, TT, BF, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : N2 (pk. 6, 7 & 128) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk. 10, 25, 28, 32, 38 & 40) ;
Zone Montsinéry : Galion, piste de Saut Léodate (pk. 4,5 & 6), piste de Nancibo (pk. 2 & 6,4) ;
Zone Coralie-Cacao : N2 (pk. 41) ;
Zone Bélizon : N2 (pk. 78-79 & 95) ;
Zone Kourou : dégrad Saramaca, N1 (pk. 70 [Chawari]) ; **Zone Sinnamary** : piste Mtgne Plomb ;
Zone Iracoubo : piste Patagaï (pk. 28), piste Dégrad Florian (pk. 3 & 6) ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier, haut Courcibo ;
Zone Bas-Maroni : Plateau des Mines, village Espérance, piste Paul Isnard (scierie), piste Crique Serpent ;
Zone Centrale : Saül (bourg, aérodrome) ;
Zone Haut-Maroni : Grand Inini (saut Batardeau).

- Toute l'année.

Morvania Cerda, 2020

Espèce type : ***Morvania dilatata*** Cerda, 2020.

• ***Morvania beneluzi*** (Pinheiro & Cerda, 2016). **Comb**. **nov**.

(Pl. 4, Fig. 17 & 19)

Heliura beneluzi Pinheiro & al., 2016, Can. Entomol. 148: 401, fig. 2, 12, 19 & 25.
- Brazil : Pará (Santarem-Fazenda Taperinha,) ; Peru : (Manu-Pakitza), French Guiana : S. L. du Maroni (p. Cr. Serpent), Mtgne de Kaw (Patawa), Bélizon (pk.15), N2 (pk.41).

Notes. – Nous avons transféré *beneluzi* dans le genre *Morvania*. Par l'habitus, la nervation et les genitalia, cette espèce présente les caractères du genre *Morvania* et non les caractères du genre *Heliura*. Toutefois, les écailles transformées (androconies) ne semblent être présentes qu'au verso des ailes postérieures (dans la moitié supérieure de la cellule et sur le bord costal). Les deux espèces ont été séquencées BOLD:AAM8540 (pour *beneluzi*) et BOLD:AET3734 (pour *dilatata)*, ces deux espèces se trouvant dans la même branche, en étant séparées de 4,8%.

We transferred *beneluzi* into the genus *Morvania*. Based on habitus, venation, and genitalia, this species exhibits the characteristics of the genus *Morvania* and not the characteristics of the *Heliura* genus. However, the transformed scales (androconia) appear to be present only on the underside of the hindwings (in the upper half of the cell and on the costal margin). The two species were sequenced BOLD:AAM8540 (for *beneluzi*) and BOLD:AET3734 (for *dilatata*), these two species are found in the same branch, separated by 4.8%.

Espèce capturée au piège lumineux, et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 11 spécimens (coll. JAC, BH, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou), N2 (pk. 128) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa ;
Zone Coralie-Cacao : Carbets de Coralie (parking d'altitude), N2 (pk. 41) ;
Zone Bélizon : pistes forestières ;
Zone Sinnamary : Pointe Combi ;
Zone Bas-Maroni :piste Crique Serpent.

- Avril-mai, d'août à octobre, de décembre à février.

Brazil : Maranhão : Acailandia- Gurupi. Avril.

• ***Morvania dilatata*** Cerda, 2020

(Pl. 4, fig. 16 & 18)

Morvania dilatata Cerda, 2020 Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9: 66, fig. 32, pl. 11, fig. 84 & 88.
- Guyane : Mtgne de Kaw (Patawa).

Espèce capturée au piège lumineux, et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 5 spécimens (coll. JAC, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw ;
Zone Bélizon : Camp Bonaventure.

- Septembre, novembre-décembre, février.

Références

Betz J. T., 1972. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (1). *Annales de la Société entomologique de France*, 8(2): 397-407.

Betz J. T., 1980. – Exploration entomologique de la Guyane française et du Moyen Xingu au Brésil Lepidoptera Amatidae. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 85: 88-93.

Betz J. T., 1981. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (6). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 86: 67-68.

Beutelspacher Baigts C. R., 1988 (1987). – Catalogo de la Coleccion Roberto Müller (Lepidoptera) del Museo de Historia Natural de la ciudad de Mexico VI. Familia Castniidae, Zygaenidae, Ctenuchidae y Nolidae. *Anales del Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autónoma de Mexico (Zool.)*, 58(1): 455-474.

Biezanko C. M., 1983. – Ctenuchidae, Nolidae, Arctiidae et Pericopidae da Zona Sueste do Rio Grande do Sul. *Revista do Centro de Ciências Rurais*, 13(4): 229-263.

Biezanko C. M., 1985. – Ctenuchidae, Arctiidae et Pericopidae da Zona Missioneira do Rio Grande do Sul. *Revista do Centro de Ciências Rurais*, 15(3): 189-210.

Burmeister H. C. C., 1878-1879. – Description Physique de la République Argentine, 5(1): vi + 524 pp.

Burmeister H. C. C., 1879-1880. – Atlas de la Description Physique de la République Argentine Contenant des Vues Pittoresques et des Figures d'Histoire Naturelle Composées par le Dr H. Burmeister, 5(2): [ii] + 64 pp., pl. i-xxiv.

Butler A. G., 1875. – Description of new Genera and Species of Lepidoptera in the Collection of the British Museum. *The Annals and Magazine of Natural History*, (4) 15: 396-399.

Butler A. G., 1876. – Notes on the Lepidoptera of the family Zygaenidae, with descriptions of new Genera and Species. *Journal of the Linnean Society, Zool*., XII: 342-433, 3 pl.

Cerda J.-A., 2020. – Révision partielle des genres Delphyre, Prosopidia, Mesocerea, Apocerea, Heliura, Eucereon, Euceriodes Hyaleucerea, et Pseudohyaleucerea, comportant la création et revalidation de nombreux genres, avec la description de nouvelles espèces. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon*, 9: 153 pp., 71 figs., 28 pl.-216 figs.

Dognin P., 1910. – Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. *Oberthur, Rennes, Fascicule* I: 3-13.



Planche 6. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale gauche. **d**. Aedeagus.

24. *Kohllius pusillus pusillus* Guyane. **25**. *Pseudohyaleucerea vulnerata* Paraguay. **26**. *Orbiptera macella* Guyane. **27**. *Orbiptera bleuzeni* Guyane.



Figure 1. Zones de collectes avec les principaux sites de récoltes.

Figure 2. Carte de répartition des espèces en Amérique néotropicale.

Dognin P., 1911a. – Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. *Oberthur, Rennes, Fascicule* II: 1-56.

Draudt 1913-1935. – *in* Seitz, Die Grossschmetterlinge der Erde des Amerikanischen Faunengebietes 6 Die amerikanischen Spinner und Schwämer. *A. Kernen Stuttgart*: 1-1337.

Draudt M., [1940?]. – *in* Seitz, Les Macrolépidoptères du Globe 6, Révision systématique des Macrolépidoptères connus jusqu' à ce jour. *E. Le Moult Paris*: 1-600.

Druce H., 1881-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. VOL. I (*TEXT.*). *London, Dulau & Co.,Bernard Quaritch* : xxxii + 490 pp.

Druce H., 1881-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. VOL. III (*PLATES.*). *London, Dulau & Co.,Bernard Quaritch* : 2 pp., 101 pl.

Druce H., 1891-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. VOL. II (*TEXT.*). *London, Dulau & Co.,Bernard Quaritch*: ii + 622 pp.

Druce H., 1898. – Descriptions of new Species of Syntomidae, chiefly in the Oxford Museum. *The Annals and Magazine of Natural History*, (7)I: 401-408.

Ferro V. G. & Diniz I. R., 2007. – Composição de espécies de Arctiidae (Insecta, Lepidoptera) em áreas de Cerrado. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24(3): 635-646.

Ferro V. G., Resende I. M. H. & Duarte M., 2007. – Arctiidae (Insecta: Lepidoptera) da Estação Biológica de Boracéia (Salesópolis, São Paulo, Brasil). *Biotaneotropica*, 7(3): 331-338.

Ferro V. G. & Teston J. A., 2009. – Composição de espécies de Arctiidae (Lepidoptera) no sul do Brasil: relação entre tipos de vegetação e entre a configuração do hábitat. *Revista Brasiliera de Entomologia*, 53(2): 278-286.

Ferro V. G., Resende I. M. H. & Duarte M., 2012. – Mariposas Arctiinae (Lepidoptera-Erebidae) do estado de Santa Catarina, Brasil. *Biota Neotropica*, 12(4): 166-180.

Forbes W. T. M., 1939. – The Lepidoptera of Barro Colorado Island, Panama. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy* 85(4): i-viii, 97-322.

Grados J., 1997. – Nocturnal Butterflies (Lepidoptera: Ctenuchinae): Boidiversity Assessment in the Lower Urubamba Region. Biodiversity Assessment and Long-term Monitoring, Lower Urubamba Region, Perú. San Martin-3 and Cashiriari-2. *Smithsonian Institution SI/MAB Biodiversity Program Institute for Conservation Biology SI/MAB Serie #1*: 127-130.

Grados J., 1999. – Lista preliminar de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 41: 9-14.

Grados J., 2001. – Lista de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la región del Bajo Río Urubamba, Cuzco, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 42: 61-67.

Grados J., 2023. – Marcado dimorfismo sexual de Heliura fenestrifer (Zerny, 1931) (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Ctenuchina). *Revista Chilena de Entomología*, 49(4): 675.

Hagmann G., 1938. – Syntomideos (Amatideos = Euchromideos) do Estado do Para. *Livro Jubilar do professor Lauro Travassos, Rio Janeiro*: 185-194.

Hampson G. F., 1898. – Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: xxi + 559 pp., 285 fig., 17 pl.

Hampson G. F., 1914. – Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. suppl 1: v-xxviii + 858 pp., 276 fig., 42 pl.

Hernández-Baz F. & Grados J., 2004. – Lista de los Ctenuchinae (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae) del Estado de Veracruz, México y Algunas Notas sobre su Riqueza en el Continente Americano. *Folia Entomológica Mexicana*, 43(2): 203-213.

Hernández-Baz F., 2007. – Los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la colección de artrópodos de la Universidad del Valle, Guatemala, Guatemala. *Dugesiana*, 14(2): 99-106.

Hernández-Baz F., 2011. – Especies de la familia Arctiidae presentes en Veracruz. Biodiversidad en Veracruz II Apéndice VIII(26): 1-11.

Hernández-Baz F., Morón M., Chamé-Vásquez E. & González J. M., 2013. – Ctenichina and Euchromiina (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae) of three biological research stations of México's Ecosur. *Journal of the Lepidopterists' Society*, 67(3): 145-155.

Hoffmann C. C., 1933. – La fauna de Lepidopteros del distrito del Sononusco, (Chiapas). Un estudio Zoogeografico. *Anales del Instituto de Biologia*, Tomo IV, 1933, NUMS. 3 Y 4: 207-307.

Hoffmann F., 1936. – Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sta. Catharina. Syntomidae. *Entomologische Rundschau*, 53(31): 446-452.

Jorgensen P., 1913. – Zur Kenntnis der Syntomiden Argentiniens (Lep.). *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie* IX(18[3]) : 74-77.

Kaye W. J. & Lamont N., 1927. – A Catalogue of the Trinidad Lepidoptera Heterocera (Moths). *Memoirs of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago*, 3: viii + 144 + xv pp., 2 pl.

Kiriakoff S. G., 1948. – Recherches sur les Organes Tympaniques des Lépidoptères en Rapport avec la classification. *Bulletin et Annales de la Société Entomologique de Belgique*, 84: 231-276.

Kirby W. F., 1892. – A Synonymic Catalogue of Lepidoptera Heterocera. (Moths) Vol. 1: xii + 951 pp.

Marinoni C. & Dutra R. C., 1996. – Levantamento da Fauna Entomológica no Estado do Paraná. II. Ctenuchidae (Lepidoptera). *Revista Brasiliera de Zoologia*, 13(2): 435-461.

Miller J. Y. & al., 2012. – An annotated list of the Lepidoptera of Honduras. *Insecta Mundi* 0205: 33. 1-72.

Pérez-Ruiz H. & Sanchez-Sarabia R., 1979. – Entomofauna de la Region de Los Tuxtlas, Veracruz I. Zoogeografia y Variables Poblacionales de Ctenúchidos (Lepidoptera, Ctenuchidae) en dos Biotopos del Estado de Veracruz. *Anales del Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autónoma de Mexico (Zool.)*, 50(1): 513-535, 3 fig.

Pérez-Ruiz H. & Sanchez-Sarabia R., 1989. – Entomofauna de la Region de Los Tuxtlas, Veracruz IV. Distribution Local y Estructura de la Comunidad de Ctenuchidas (Lepidoptera: Ctenuchidae), en la comunidad de Pinaceas con Notas sobre su Distribution Geografica. *Anales del Instituto de Biologia Universidad Nacional Autónoma de México (Zool.)*, 60(3): 383-399.

Piñas S. J. & Manzano I., 2003. – Mariposas del Ecuador vol. 21b. Familia: Arctiidae. Subfamilia: Ctenuchinae. *Compañía de Jesús*: ii-iii + 91 pp.

Pinheiro L. R. & Gall-Haszler S., 2015. – Illustrated catalogue of Neotropical Ctenuchina, Euchromiina and Pericopina types (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini) described by Hans Zerny, with discussion on their taxonomic status. *Zootaxa*, 3925(4): 505-535.

Pinheiro L. R., Cerda J.-A. & Duarte M., 2016. – Description of five new species of Heliura, Butler (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Arctiini: Ctenuchina), with discussion of H. pierus

(Cramer) and the H. stolli (Rothschild) species Group. *The Canadian Entomologist*, 148: 396-415.

Pinheiro L. R. & Duarte M., 2016. – Description of nine new species of Heliura Butler from South America (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)*: 1-21.

Pinheiro L. R. & Duarte M., 2017. – Revision of the Neotropical moth genus *Ptychotrichos* Schaus (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina). *Zootaxa*, 4312 (2): 246-258.

Powel S., Lacher T. & Woolley J., 2008. – A Survey of the Order Lepidoptera on the Island of Dominica.

Rego Barros A.R. & Machado J.P., 1971. – Estudo dos Ctenuchidae Neotropicais I. Sobre o Gênero Hyaleucerea Butler, 1875. *Arquivos do Museo National*, LIV: 171-177, 11fig.

Rothschild L. W., 1912. – New Syntomidae. *Novitates Zoologicae*, 19(2): 151-186.

Schrottky C., 1902. – Beitrag zur Kenntniss der Syntomiden Argentiniens. *Deutsche Entomologische Zeitschrift "Iris"* XV: 133-136.

Schrottky C., 1909. – „Mimetische" Lepidopteren ein Beitrag zur Kenntnis der Syntomidae Paraguays. *Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris", Dresden,* 22(2): 122-132.

Sylva J. M. & Sylva J. E., 2014. – Contribuição para o Conhecimento da Fauna de Arctiinae (Lepidoptera: Erebidae) no Estado deSanta Catarina, Brasil. *EntomoBrasilis*, 7(3): 222-226.

Teston J. A. & Corseuil E., 2003. – Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brazil. Parte III. Ctenuchini e Euchromiini. *Biocienscias*, 11(1): 81-90.

Teston J. A. & Corseuil E., 2004. – Diversidade de Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) capturados com armadilha luminosa, em seis comunidades no Rio Grande do Sul, Brazil. *Revista Brasiliera de Entomologia*, 48 (1): 77-90.

Teston J. A., Specht A., Di Mare R. A. & Corseuil E., 2006. – Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) coletados em unidades de conservação estaduais do Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista. Brasiliera de Entomologia* 50(2): 280-286.

Teston J. A. & Correa D., 2015. – The Arctiini (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) fauna of the Serra do Pardo National Park, Pará, Brazil. *Check List*, 11(2) 1613: 1-9.

Teston J. A., Abreu D. & Ferro V., 2019. – Arctiini [Leach] (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) of Brasilian Amazon. III – Subtribe Ctenuchina Kirby, 1837. *Biotaneotropica*, 19(2): 1-19.

Travassos L. Filho, 1940. – Contribuiçao a Zoogeografia dos Euchromiidae Brasileiros I. Material Colhido em Ilha Sèca, Estado de Sáo Paulo e Salobra, Estado de Mato Grosso, de Fevereiro a Março de 1940. *Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo*, II(10): 281-297.

Travassos L. Filho, 1945. – Ctenuchidae de Monte Alegre. *Papéis Avulsos*, VI(4): 29-36.

Turrent-Diaz R. & Pescador Rubio A., 2013. – La fauna de las tribus Euchormini y Ctenuchini (Lepidóptera, Familia Erebidae) de la región de Chajul Chiapas (Marqués de Comillas). *Revista de la Sociedad Mexicana de Lepidopterología*, I(1): 1-15.

Watson A., Fletcher D.S. & Nye I.W.B., 1995. – The Generic Names of Moths of the World Volume 2 (2ème éd.) Noctuoidea: Arctiidae to Thyretidae: [i]-xiv + 228 pp., 12 fig.

Zerny H., 1912. – Syntomidae. Lepidopterum Catalogus, 7: 179 pp.

Zerny H., 1931a. – Beiträge zur Kenntnis der Syntomiden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris", Dresden*, 45: 1-26, 1 pl.

Zerny H., 1931b. – Ergebnisse einer Zoologischen Sammelreise nach Brasilien, Insbesondere in das Amazonzasgebiet, Ausgeführt von Dr. H. Zerny. VII. Teil. Lepidoptera III: Die Syntomiden des Staates Pará. *Annales des Naturhistorischen Museum in Wien*, 45: 225-263.

Zikán C. F., 1928. – Die Macro-Lepidoptera des Itatiaya (Südabhang bei Campo-Bello). *Entomologisches Rundschau*, 45(10): 38-39.

Abstract

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Pseudagyrta* - *Pseudohyaleucerea* - *Kohllius* - *Polygonoptera* - *Orbiptera* & *Morvania* (Part 4). 21th note. *Faunitaxys*, 14(34) : 1 – 17.

Ten species from French Guiana are treated. Two combinations are new: *Morvania beneluzi* (Pinheiro & Cerda, 2016) **comb**. **nov**., and *Kohllius pusillus flaviventris* (Draudt, 1916) **comb**. **nov**. One synonymy is new: *Orbiptera germana* (Rothschild, 1912) **syn**. **nov**. One species is new for French Guiana: *Pseudohyaleucerea vulnerata* (Butler, 1875).

Keywords. – Erebidae, Arctiinae, Ctenuchina, *Kohllius*, *Polygonoptera*, *Orbiptera*, *Morvania*, taxonomy, French Guiana.

Derniers articles publiés

Lourenço W. R. & Velten J., 2026. – Description of a new genus and species associated to the family Chaerilobuthidae Lourenço & Beigel, 2011 from Early Cretaceous Burmite (Chelicerata: Scorpiones). *Faunitaxys*, 14(29): 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(29)

Ythier E. & Lourenço W. R., 2026. – A new species of *Brotheas* C. L. Koch, 1838 from Brazilian Amazonia (Scorpiones: Chactidae). *Faunitaxys*, 14(30): 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(30)

Platia G., Mertlik J. & Dušánek V., 2026. – New species, new records, new sex descriptions and new combinations of click beetles from China (Coleoptera, Elateridae). *Faunitaxys*, 14(31): 1 – 35. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(31)

Vives E., 2026. – Dos nuevas especies del género *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Longicornios nuevos de Vietnam (Pars 14). *Faunitaxys*, 14(32) : 1 – 4. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(32)

Vincent B., 2026. – Révision du genre *Bernathonomus* Fragoso, 1953 et description de deux espèces nouvelles et quatre sous espèces (Insecta Lepidoptera Erebidae Arctiinae). *Faunitaxys*, 14(33) : 1 – 17. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(33)

Faunitaxys

Volume 14, Numéro 34, Mai 2026

SOMMAIRE

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Pseudagyrta - Pseudohyaleucerea - Kohllius - Polygonoptera - Orbiptera & Morvania* (4e article). 21e note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 17

CONTENTS

Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Pseudagyrta - Pseudohyaleucerea - Kohllius - Polygonoptera - Orbiptera & Morvania* (Part 4). 21th note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 17

Illustration de la couverture :

Carollia perspicillata, Montagne de Kaw. Nicolas Defaux

Crédits:

Nicolas Defaux : couverture.
Jean-Aimé Cerda : Planches 1-4.
Michel Laguerre : Planches 4-6.

Publié par l'Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)